

## pioglitazone (chlorhydrate de)

Actos

Apo- Pioglitazone

Auro- Pioglitazone

Co Pioglitazone

Jamp- Pioglitazone

Mint- Pioglitazone

Mylan- Pioglitazone

Novo- Pioglitazone

Pioglitazone

Pioglitazone HCl Pro-

Pioglitazone Ran-

Pioglitazone Sandoz

Pioglitazone Teva-

Pioglitazone VAN-

Pioglitazone phl-

Pioglitazone pms-

Pioglitazone ratio-

Pioglitazone

## EN117

Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale;

*À titre informatif, l'association de la pioglitazone et de l'insuline de même que l'association de la rosiglitazone et de l'insuline augmentent le risque d'insuffisance cardiaque congestive.*

## EN118

Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2, **en association avec la metformine**, lorsqu'une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace;

Par inefficacité, on entend une non-atteinte de la valeur d'hémoglobine glyquée (HbA1c) adaptée au patient.

*À titre informatif, l'association de la pioglitazone et de l'insuline de même que l'association de la rosiglitazone et de l'insuline augmentent le risque d'insuffisance cardiaque congestive.*

## EN119

Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2, **en association avec une sulfonylurée**,

lorsque la metformine est contre- indiquée, non tolérée ou inefficace;

Par inefficacité, on entend une non-atteinte de la valeur d'hémoglobine glyquée (HbA1c) adaptée au patient.

À titre informatif, l'association de la pioglitazone et de l'insuline de même que l'association de la rosiglitazone et de l'insuline augmentent le risque d'insuffisance cardiaque congestive.

## **pioglitazone (chlorhydrate de)**

Actos

Apo- Pioglitazone

Auro- Pioglitazone

Co Pioglitazone

Jamp- Pioglitazone

Mint- Pioglitazone

Mylan- Pioglitazone

Novo- Pioglitazone

Pioglitazone

Pioglitazone HCl Pro-

Pioglitazone Ran-

Pioglitazone Sandoz

Pioglitazone Teva-

Pioglitazone VAN-

Pioglitazone phl-

Pioglitazone pms-

Pioglitazone ratio-

Pioglitazone

## **EN120**

Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2, **en association avec la metformine et une sulfonylurée**, lorsque le passage à l'insulinothérapie est indiqué mais que la personne n'est pas en mesure de la recevoir;

*À titre informatif, l'association de la pioglitazone et de l'insuline de même que l'association de la rosiglitazone et de l'insuline augmentent le risque d'insuffisance cardiaque congestive.*

## **EN121**

Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 lorsque la metformine et une sulfonylurée ne peuvent être utilisées en raison de contre-indication ou d'intolérance à ces agents;

*À titre informatif, l'association de la pioglitazone et de l'insuline de même que l'association de la rosiglitazone et de l'insuline augmentent le risque d'insuffisance cardiaque congestive.*